

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002.2024

GABARITO DA PROVA TEÓRICA

O Cisdeste divulga o gabarito da prova teórica do processo seletivo simplificado 002.2024 para Técnico de Enfermagem.

1. Considerando as diretrizes da American Heart Association (AHA) de 2015 para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), no adulto, marque a CORRETA:
Opção Correta: 100 a 120/min, com profundidade de 5 a 6 cm.
2. No atendimento inicial do doente traumatizado, todas as manobras citadas devem ser realizadas, EXCETO:
Opção Correta: Manobra de hiperextensão do pescoço.
3. Enquanto passeava pelo shopping, você percebe um pedido de socorro feito pela filha de um senhor de cerca de 60 anos que acabara de desmaiar. Você, prontamente, se identifica como socorrista e constata que a vítima não responde, não respira e não tem pulso, logo solicita que a filha do paciente ligue para 192 e que o segurança do shopping traga o Desfibrilador Externo Automático (DEA), enquanto você inicia a RCP com compressões torácicas de alta qualidade. O segurança trouxe o DEA em menos de um minuto. Marque a CORRETA:
Opção Correta: Instalaria imediatamente o DEA, sem interromper as compressões torácicas e seguiria as instruções para saber se a terapia elétrica seria recomendada.
4. Você está caminhando em uma avenida e presencia um atropelamento onde a vítima politraumatizada, encontra-se caída ao solo com sangramento exsanguinante no membro inferior direito. Após fazer a segurança da cena e solicitar ajuda, em qual momento deve ser estabilizada a coluna cervical seguindo a sequência XABCDE (PHTLS 9º edição, 2018)? Marque a CORRETA:
Opção Correta: Após a contenção de hemorragia exsanguinante.
5. Um dos componentes iniciais da Política de Atenção às Urgências foi a implantação do SAMU, que é contatado pelo número 192 e presta atendimento em ambulância de suporte avançado e suporte básico de vida. A sigla SAMU significa:
Opção Correta: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

6. Tríade da morte no trauma: Marque a <u>CORRETA</u> :
Opção Correta: Acidose, coagulopatia, hipotermia.
7. Você saiu para atender um trabalho de parto em domicílio. Diante da resposta “não” a pelo menos uma das três perguntas: “gestação a termo? Respira ou chora? Presença de tônus muscular em flexão?” Devem ser executados em 30 segundos os passos iniciais da estabilização do recém-nascido. Marque a <u>CORRETA</u> :
Opção Correta: Prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar boca e narinas (se necessário) e secar.
8. Um profissional de saúde encontra um bebê de 9 meses em PCR e inicia o SBV. Marque a <u>INCORRETA</u> :
Opção Correta: Com apenas 1 socorrista deve ser realizado 15:2.
9. Antes de realizar a imobilização de um membro é importante. Marque a <u>INCORRETA</u> :
Opção Correta: Avaliar pressão arterial média.
10. Para identificação de pulso do recém-nascido é correto:
Opção Correta: Aferir pulso braquial.
11. No Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado (PHTLS), durante a reanimação cardiopulmonar, é necessário seguir as prioridades estabelecidas nos Protocolos de Atendimento ao Paciente em Situação de Emergência, dentre as quais se tem a abertura de via aérea. Nessa perspectiva, considerando um paciente vítima de trauma que tem comprometimento de via aérea, o profissional deve realizar a manobra de:
Opção Correta: Elevação do mento no trauma ou tração da mandíbula no trauma.
12. A escala de coma de Glasgow é um método para definir o estado neurológico de pacientes com uma lesão cerebral aguda, analisando seu nível de consciência. Assinale a alternativa correta, sobre a Resposta Verbal. Quando o paciente é questionado ele:
Opção Correta: Verbaliza apenas gemidos; sons (pontuação 2).
13. Em 2020, foi lançado o novo PHTLS 9ª edição, no qual o antigo ABCDE foi reavaliado e agora recebeu o nome de XABCDE, no que concerne à sequência de avaliação primária. O acréscimo desse X diz respeito:
Opção Correta: Ao controle de hemorragia externa grave.

<p>14. No atendimento pré-hospitalar do paciente com TCE, as ações prioritárias/primárias de assistência incluem:</p>
<p>Opção Correta: Avaliar a segurança de cena, assegurar a estabilização da cabeça, a colocação do colar cervical e a imobilização da coluna.</p>
<p>15. Os profissionais de cuidados pré-hospitalares dispõem de diferentes dispositivos para manejo das vias aéreas e ventilação. Qual destes é um dispositivo simples indicado para manter as vias aéreas pérvias?</p>
<p>Opção Correta: Cânula orofaríngea.</p>
<p>16. Ao atender uma ocorrência pré-hospitalar, você se depara com uma vítima com trauma torácico penetrante por arma de fogo no hemitórax direito, apresentando sinais de desconforto respiratório. Como técnico socorrista, qual a conduta correta com a lesão, segundo as recomendações mais atuais do Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)?</p>
<p>Opção Correta: Aplicar curativo valvulado.</p>
<p>17. Como técnico da equipe de socorro de Suporte Básico de Vida, você foi chamado para atender uma vítima de trauma de tórax autoinfligido, por tentativa de suicídio, que se apresentava estável. Ao chegar ao local de atendimento, você observou que o objeto utilizado (uma faca de cozinha) ainda estava encravado no lado direito do tórax. Qual a conduta mais adequada?</p>
<p>Opção Correta: Fixar e imobilizar o objeto com curativo para evitar movimentação durante o transporte.</p>
<p>18. A viatura em que você atua como técnico socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada pela Central de Regulação Médica para atender a uma ocorrência de acidente automobilístico, envolvendo colisão entre um veículo automotor de passeio e uma moto. O motorista do veículo informou para a Central que estava bem, mas a vítima que conduzia a moto foi lançada ao solo, apresentava várias escoriações com sangramento, não conseguia se levantar e reclamava de dor. Nesse caso, qual a sequência correta da avaliação primária?</p>
<p>Opção Correta: Exposição/ambiente, via aérea e estabilização da coluna cervical, ventilação, circulação e hemorragia e disfunção neurológica.</p>
<p>19. No Atendimento de urgência e emergência frente a distúrbios neurológicos foi identificado que a vítima apresentava sinais de AVC isquêmico, para uma avaliação eficiente desse paciente no Atendimento Pré-Hospitalar (APH) é utilizada a escala de:</p>
<p>Opção Correta: Cincinnati.</p>

20. No atendimento pré-hospitalar, é usada a escala de Glasgow para realizar avaliação neurológica, seus valores variam de acordo com as condições em que o paciente se encontra. Essa escala tem como objetivo avaliar:

Opção Correta: **Abertura ocular – resposta verbal – resposta motora.**

Juiz de Fora, 11 de março de 2024.